

УДК 616.33-089:616-053.1+616-053.31-073.4-8

**О.К. Слєпов¹, І.Ю. Гордієнко¹, В.Л. Весельський², О.М. Тарапурова¹,
Г.О. Гребініченко¹, В.П. Сорока¹, О.П. Пономаренко¹, А.В. Величко¹**

Перинатальна діагностика гастрошизису у плодів та новонароджених дітей*

¹ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України», м. Київ, Україна

²Національна академія медичних наук України, м. Київ, Україна

PERINATOLOGIYA I PEDIATRIYA. 2016.2(66):70-76; doi 10.15574/PP.2016.66.70

Мета — розробити і удосконалити характер та об'єм пренатальної і ранньої постнатальної діагностики гастрошизису у плодів і новонароджених дітей.

Пacienti та методи. В ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України» за 2006–2015 рр. пренатально обстежено 43 плоди з гастрошизисом. Під час пренатального обстеження плода з гастрошизисом, крім спеціалістів УЗД, обов'язково був присутній дитячий хірург.

Результати. У 100% оперованих новонароджених дітей з гастрошизисом діагноз установлено пренатально. Частота ранньої пренатальної діагностики гастрошизису (до 22 тижнів гестації) — 43,6%, що потребує подальшого удосконалення.

Висновки. Основними критеріями пренатальної діагностики гастрошизису в плода є: локалізація і величина наскрізного дефекту передньої черевної стінки, характер евентрованих органів, їх стан та об'єм; об'єм черевної порожнини і ступінь вісцeroабдомінальної диспропорції; виявлення асоційованих вад розвитку та захворювань; кількість навколоплідних вод; цитогенетичне дослідження з визначенням каріотипу плода. Алгоритм постнатальної діагностики гастрошизису та асоційованих вад розвитку і захворювань у новонароджених включає: УЗД органів черевної порожнини і заочеревинного простору; ехокардіографію і нейросонографію; оглядову рентгенографію органів грудної клітки і черевної порожнини, пасаж контрасту по шлунково-кишковому тракту, іріографію — при підозрі на кишкову непроходимість; консультацію невролога, а за необхідності — й інших спеціалістів.

Ключові слова: новонароджені діти, гастрошизис, пренатальна діагностика, постнатальна діагностика.

Вступ

Гастрошизис (ГШ) — одна з найтяжчих вад у новонароджених, яка характеризується природженою евентрацією органів черевної порожнини за межі передньої черевної стінки (ПЧС) в амніотичну рідину через наскрізний дефект ПЧС. Дефект прилягає до нормальної, незміненої пуповини, як правило, справа від пупка, пупкове кільце розщеплене, евентровані органи не прикриті ембріональними оболонками або їх залишками [3, 7, 13, 28]. Частота ГШ на сьогодні досить висока і становить 0,31–4,72 випадку на 10 000 новонароджених та має тенденцію до зростання в усьому світі [15, 18, 29].

Смертність при ГШ залишається високою і коливається в широких межах від 4% до 100% залежно від регіону [1, 2, 5, 13, 14, 23, 28]. Мертвонароджуваність при ГШ сягає 10% [13]. Загибель плода частіше відбувається наприкінці третього триместру вагітності [25] і може бути обумовлена внутрішньоутробним заворотом середньої кишки, гострим порушенням пуповинного кровообігу через компресію евентрованим кишечником, загальною цитокін-опосередкованою запальнюю реакцією, патологією об'єму амніотичної рідини (50% мертвонароджених пов'язано з маловоддям, 16,7% — з багатоводдям) [9, 16, 23].

Раннє пренатальне виявлення вад розвитку в плода, у тому числі ГШ, є одним із пріоритетних завдань перинатології [4]. За останні кілька десятиліть перинатальна діагностика ГШ значно поліпшилася, введені відповідні перинатальні консультування [11, 18]. Дослідження, проведені за останні 5 років, засвідчили, що ГШ пренатально виявляється у 79–97% випадків [18, 24]. У країнах Африканського континенту, натомість, ГШ пренатально діагностується лише в 10–12% випадках серед усіх новонароджених із цією вадою, а серед пренатально обстежених матерів за допомогою ультразвукового дослідження (УЗД) діагноз ГШ установлюється лише в 50% випадків [28].

Переважна більшість дослідників вважає, що пренатальна діагностика дає змогу вчасно виявити ваду, до пологів направити жінку до перинатального центру, бажано сумісно з відділенням дитячої хірургії заличити багатопрофільну групу спеціалістів: акушерів-гінекологів, генетиків, неонатологів і дитячих хірургів — для визначення тактики ведення вагітності, терміну та способу родорозрішення та

ранньої корекції аномалії, яка явно впливає на виживання новонароджених із ГШ [11, 28].

Ембріогенез ГШ формується на ранніх термінах гестації: між 3 і 5-м тижнем внутрішньоутробного розвитку [27].

Більшість випадків ГШ на сьогодні діагностується при планових пренатальних УЗД. Причому за допомогою сучасних високочутливих апаратів УЗД можна виявити ГШ вже на 10-му тижні гестації [20]. Проте для кращої достовірності остаточний діагноз ГШ має бути відкладений до 14-го тижня гестації, тому що фізіологічна венtrальна грижа зникає до кінця 11-го тижня гестації [12].

При пренатальному УЗД визначається декілька окружних, товстостінних, анехогенних трубчастих структур, які знаходяться поза межами ПЧС і не вкриті оболонками [8]. При цьому в плоді із ГШ у 60% випадків спостерігається недоношеність, часто виявляється затримка внутрішньоутробного розвитку (ЗВУР) із наявністю помірного або значного маловоддя, а також у 10–31% — асоційовані вади розвитку (атрезії кишечнику, крипторхізм тощо) [10, 20, 21]. За даними Kronfli R et al. (2010) атрезія кишечнику пренатально діагностується у 87% випадків. Деякі дослідники підкреслюють роль пренатальної і постнатальної ехокардіографії, оскільки, за їх даними, серцеві аномалії зустрічаються в 15% випадків при ГШ [6].

Багатоцентрове пренатальне УЗД 2023 плодів, проведене у країнах Європи (Англії, Франції, Нідерландах, Швейцарії, Італії), виявило основні фактори ризику щодо виникнення постнатальних ускладнень ГШ, які впливають на прогноз цієї вади розвитку. До таких факторів ризику віднесено: внутрішньочеревне розширення кишечнику, багатоводдя і розширення шлунка [22].

Плід із ГШ потребує ретельного пренатального спостереження в умовах перинатального центру [13]. Кількість і час пренатального обстеження плода з ГШ дискутується. Деякі автори вважають, що пренатальне УЗД — моніторинг плода слід проводити кожні 2 тижні, з моменту встановлення діагнозу [10], з 28-го тижня гестації [26] або з 32-го тижня [23].

Щодо різних аспектів антенатальної діагностики ГШ у плода, висвітлених вище, у сучасній літературі немає повідомлень про пренатальне визначення ступеня відповідності об'єму евентрованих в амніотичну рідину органів

* При публікації статі №1(65) 2016 були допущені технічні ошибки. Редакція приносить свої ізвини авторам і публікує статію в исправленном варианте.

черевної порожнини до об'єму власне черевної порожнини плода, тобто ступеня вісцероабдомінальної диспропорції (ВАД). Остання відіграє вирішальну роль при розробці хірургічної тактики в ранньому неонатальному періоді. Тому, на нашу думку, надзвичайно важливо проводити подальші дослідження в цьому напрямку. Крім того, важливим моментом залишається характер і об'єм постнатальної діагностики в новонароджених із ГШ.

Мета роботи – розробити і удосконалити характер та об'єм пренатальної і ранньої постнатальної діагностики гастрошизису у плодів і новонароджених дітей.

Матеріали та методи дослідження

В ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України» (далі – ІПАГ) за період 2006–2015 рр. пренатально обстежено 43 плоди з ГШ. В усіх новонароджених цей діагноз підтверджено постнатально, у ранньому, неонатальному періоді. Усім новонародженим проведено хірургічну корекцію вади. Під час пренатального обстеження плода з ГШ, крім спеціалістів УЗД відділення медицини плода ІПАГ, обов'язково був присутній дитячий хірург.

Визначено такі критерії пренатальної діагностики ГШ у плодів: стать, гестаційний вік на момент встановлення діагнозу, величину наскрізного дефекту ПЧС, характер евентрованих органів та їх об'єм, характеристику просвіту та товщини стінки евентрованого кишечнику, кількість навколоплідних вод, наявність асоційованих вад розвитку

та патологічних станів, інвазивне визначення каріотипу плода. Із січня 2011 р. нами вперше розроблено і впроваджено пренатальне визначення ступеня за допомогою УЗД плода наявності і ступеня ВАД як одного з головних критеріїв тяжкості перебігу ГШ, який впливає на тактику постнатальної хірургічної корекції вади. Наявність і ступінь ВАД визначено як відношення об'єму черевної порожнини (без об'єму паренхіматозних органів) до об'єму евентрованих органів.

З метою постнатального дослідження використано: ехокардіографію, нейросонографію, УЗД органів черевної порожнини і заочеревинного простору, оглядову рентгенографію органів черевної порожнини і грудної клітки, пасаж рентген-контрастної речовини по шлунково-кишковому тракту (ШКТ), іригографію, консультації спеціалістів (невролога, педіатра, а за необхідності – й інших).

Результати дослідження та їх обговорення

У таблиці продемонстровано основні критерії пренатальної діагностики ГШ та супутньої патології у 43 плодів.

Раннє пренатальне обстеження (до 22 тижнів гестації) виконано у 17 (43,6%) плодів з ГШ, а пізнє (після 22 тижнів гестації) – у 56,4% (n=22).

У більшості випадків (82,1%, n=32) антенатальне обстеження було дво-, три- або чотирикратним, тобто проведено пренатальну диспансеризацію плодів із ГШ. Причому двократне обстеження було в 46,9% (n=15) випадків,

Таблиця

Основні критерії пренатальної діагностики гастрошизису у 43 плодів

| № | Гестаційний вік плода на момент ПД (т) | Розміри дефекту ПЧС (мм) | Характер евентрованих органів та їх об'єм (мм ³) | Стан евентрованих органів | Об'єм черевної порожнини (мм ³) | Індекс ВАД | Кількість навколо-плідних вод | Асоційовані вади і захворювання | Дослідження каріотипу плода | Маса тіла і гестаційний вік при народженні | Наслідки лікування |
|----|--|--------------------------|--|---------------------------|---|------------|-------------------------------|--|---|--|--------------------|
| 1 | | | | | | | | | | 2700 г (41 т) | Вижив |
| 2 | 34 | 24 | Тонка і товста кишка (конгломерат) (75852) | Петлі ущільнені | - | - | Маловоддя | • ПВС-ДМШП, • піелоектазія двобічна, • ФПН, • в/у інфікування | Пізнє звернення | 2900 г (35-36 т) | Вижив |
| 3 | | | | | | | | | | 2240 г (37 т) | Помер |
| 4 | 36-37, 37-38 | 30 | Тонка і товста кишка (конгломерат) (93280) | Петлі розширені | - | - | Маловоддя | ЗВУР (асим.) | Кордоцентез, 37-38 т (норма) | 2500 г (38 т) | Вижив |
| 5 | 20-21, 30, 34-35 | 25 | Тонка і товста кишка (конгломерат) (55552) | Петлі ущільнені | - | - | Нормоводдя | | Відмова батьків | 2360 г (37 т) | Вижив |
| 6 | 17-18, 19, 34-35 | 30 | Тонка і товста кишка (107520) | Без змін | - | - | Маловоддя | | Біоптат плаценти, 19 т (норма) | 2560 г (37 т) | Вижив |
| 7 | 34-35 | 26,5 | Тонка і товста кишка (191216) | Без змін | - | - | Нормоводдя | в/у інфікування | пуповинна кров, кордоцентез, 34 т (норма) | 2320 г (35 т) | Вижив |
| 8 | 24, 32-33, 36-37 | 27,5 | Тонка і товста кишка (190808) | Без змін | - | - | Багатоводдя | | Кордоцентез, 36-37 т. (норма) | 3700 г (38 т) | Вижив |
| 9 | 38 | 35 | Тонка і товста кишка | Без змін | - | - | Нормоводдя | • ЗВУР II-III (сим.) • ФПН, • хромосомна патологія | Пізнє звернення | 2340 г (38 т) | Вижив |
| 10 | 34-35 | 20 | Тонка і товста кишка (85860) | Петлі розширені | - | - | Нормоводдя | | Пізнє звернення | 3400 г (38 т) | Вижив |

| № | Геста-ційний вік плода на момент ПД (т) | Розміри дефекту ПЧС (мм) | Характер евентро-ваних органів та їх об'єм (мм ³) | Стан евентро-ваних органів | Об'єм черевної порожнини (мм ³) | Індекс ВАД | Кількість навколо-плідних вод | Асоційовані вади і захворювання | Дослідження каротипу плода | Маса тіла і геста-ційний вік при народженні | Наслідки лікування |
|----|---|--------------------------|---|--|---|------------|-------------------------------|---|---|---|--|
| 11 | 28-29, 31-32, 32 | 28 | Тонка і товста кишка | Петлі ущільнені і розширені (376216) | - | - | Нормоводдя | - | Відмова батьків | 2590 г (32 т) | Помер |
| 12 | - | - | Тонка і товста кишка (419175) | Петлі ущільнені і розширені | - | - | Нормоводдя | - | - | 2600 г (37 т) | Вижив |
| 13 | 35-36 | 18,5 | Тонка і товста кишка | Петлі розширені | - | - | Нормоводдя | - | Пізне звернення | 3280 г (39 т) | Вижив |
| 14 | 20, 34-35, 36-37 | 18,5 | Тонка і товста кишка (110400) | Без змін | - | - | Нормоводдя | - | Кордоцентез, 34-35 (норма) | 2070 г (36 т) | Вижив |
| 15 | 15-16, 17, 33, 36 | 33,5 | Тонка і товста кишка | Петлі ущільнені і розширені | - | - | Багатоводдя | - | Біопсія плаценти, 17 т (норма) | 4020 г (38 т) | Вижив |
| 16 | 34 | 24 | Тонка і товста кишка (331080) | Петлі ущільнені і розширені | - | - | Нормоводдя | Кишкова непрохідність | Пізне звернення | 2480 г (38 т) | Помер |
| 17 | 31-32, 33 | 24 | Тонка і товста кишка (158400) | Петлі ущільнені | - | - | Маловоддя | - | Кордоцентез, + біопсія плаценти, 31-32 т (норма) | 2450 г (38 т) | Помер |
| 18 | 36-37 | 28 | Тонка і товста кишка (643416) | Петлі ущільнені | - | - | Багатоводдя | Кишкова непрохідність | Пізне звернення | 2400 г (37 т) | Вижив |
| 19 | 28-29, 34-35 | 27 | Тонка і товста кишка (36950) | Петлі ущільнені | 41540 | 1,12 | Багатоводдя | Кишкова непрохідність | Пуповинна кров (транс-абдомінальний кордоцентез), 28-29 т (норма) | 2320 г (38 т) | Помер |
| 20 | 23, 24-25 | 14 | Тонка і товста кишка | Петлі розширені з рівнем рідини, ущільнені | - | - | Нормоводдя | Кишкова непрохідність | Кордоцентез, 24-25 т (норма) | 2140 г (33 т) | Помер |
| 21 | 27, 36 | 24,5 | Тонка і товста кишка (338148) | Петлі ущільнені | 216414,7 | 0,64 | Маловоддя | - | Відмова батьків | 2100 г (36 т) | Вижив |
| 22 | 17, 20, 36-37 | 30 | Тонка і товста кишка (211560) | Петлі ущільнені | 84624,0 | 0,4 | Нормоводдя | ЗВУР I ст. | Біопсія плаценти, 17 т (норма) | 2100 г (38 т) | Вижив |
| 23 | 24-25, 26-27, 34-35 | 27 | Тонка і товста кишка (177744) | Петлі ущільнені | 95981,7 | 0,54 | Нормоводдя | Післоектазія правої нирки | Біопсія плаценти, 26-27 т (норма) | 3100 г (37 т) | Вижив |
| 24 | 32-33, 34, 35-36, 36 | 14 | Тонка і товста кишка (201600) | Петлі ущільнені | 695520,0 | 3,45 | Нормоводдя | ЗВУР I ст. (сим.) | Пуповинна кров, 32-33 т (норма) | 1950 г (37т) | Вижив |
| 25 | 13-14, 22-23, 37-38 | 26 | Тонка і товста кишка (103600) | Петлі ущільнені | 2929003 | 2,8 | Маловоддя | - | Біопсія хоріона, 13-14 т (норма) | 2800 г(38 т) | Вижив |
| 26 | 31-32, 33 | 17,5 | Тонка і товста кишка (67680) | Петлі ущільнені | 366212 | 5,4 | Маловоддя | ФПН | Абдомінальний кордоцентез, пуповинна кров, 33 т (норма) | 1830 г (35 т) | Вижив |
| 27 | | | | | | - | | - | - | 2100 г (36 т) | Вижив |
| 28 | 28-29, 32-33 | 18,5 | Тонка і товста кишка (104720) | Петлі ущільнені і розширені | 335104 | 3,2 | Маловоддя | • ЗВУР I-II (асим.), • ФПН | Кордоцентез, 32-33т (норма) | 2000 г (34 т) | Вижив |
| 29 | 15, 20, 32-33 | 26 | Тонка і товста кишка (927905,4) | Петлі ущільнені | 85669,5 | 3,07 | Нормоводдя | - | Відмова батьків | 3900 г (37 т) | Вижив |
| 30 | 15, 31-32, 34-35 | 9 | Тонка і товста кишка, шлуночок (5126665) | Петлі ущільнені | 227920 | 1,79 | Багатоводдя | • 2 бічна косолапість • УЗД марк. хр. патології | Кордоцентез, 32 т. (норма) | 1870 г (35 т) | Вижив, переведено на ШВЛ в інший мед. заклад |

| № | Гестаційний вік плода на момент ПД (т) | Розміри дефекту ПЧС (мм) | Характер евентрованих органів та їх об'єм (мм ³) | Стан евентрованих органів | Об'єм черевної порожнини (мм ³) | Індекс ВАД | Кількість навколо-плідних вод | Асоційовані вади і захворювання | Дослідження каротипу плода | Маса тіла і гестаційний вік при народженні | Наслідки лікування |
|----|--|--------------------------|--|--|---|------------|-------------------------------|---|--|--|--------------------|
| 31 | 20, 30-31 | 21,8 | Тонка і товста кишка (175968) | Петлі розширені | 130776,7 | 0,74 | Маловоддя | • Сколіоз, • дистопія нирок, • СЗРП I-II ст. | Відмова батьків | 1850 г (36 т) | Помер |
| 32 | 37 | 24,5 | Тонка і товста кишка (857070) | Петлі ущільнені і розширені | 385681,5 | 0,45 | Нормоводдя | • СЗРП I-II ст. (сим.), • неповне подвоєння обох нирок | Пізнє звернення | 2390 г (38 т) | Вижив |
| 33 | 20-21, 34 | 17,4 | Тонка і товста кишка (326625) | Без змін | 455198 | 1,34 | Маловоддя | СЗРП | Біопсія плаценти, 20-21 т (норма) | 2600 г (35-36 т) | Вижив |
| 34 | 18, 21-22, 28-29, 34 | 22 | Тонка і товста кишка (221760) | Петлі розширені | 397858,6 | 1,79 | Маловоддя | • СЗРП II-III, • кишкова непрохідність | Відмова батьків | 2300 г (36-37т) | Вижив |
| 35 | 32, 37 | 23 | Тонка і товста кишка (622440) | Петлі розширені, фібрин, некроз стінок | 411432 | 0,66 | Багатоводдя | • Сколіоз, • СЗРП I, • кишкова непрохідність | Пуповинна кров, кордоцентез, 32 т (норма) | 2400 г (38 т) | Помер |
| 36 | 20-21, 30-31, 35-36 | 16,5 | Тонка і товста кишка (854090,5) | Петлі розширені | 463514,7 | 0,55 | Маловоддя | • Кишкова непрохідність, • подвоєння правої нирки | Відмова батьків | 2600 г (37 т) | Вижив |
| 37 | 14, 33 | 38 | Тонка і товста кишка (277274,8) | Петлі розширені і ущільнені. | 385411,9 | 1,39 | Нормоводдя | • Кишкова непрохідність, • СЗРП 0-I (асим.) | Біопсія плаценти, 14 т (норма) | 1900 г (33-34 т) | Вижив |
| 38 | 14, 33, 33-34 | 22,7 | Тонка і товста (117255,6) | Петлі ущільнені | 281412 | 2,4 | Маловоддя | - | Біопсія плаценти, 14 т (норма) | 2080 г (36-37т) | Вижив |
| 39 | 30-31, 34-35 | 30 | Тонка і товста кишка (918720) | Петлі розширені | 404236,8 | 0,44 | Маловоддя | • Кишкова непрохідність, • СЗРП II | Відмова батьків | 2200 г (37 т) | Помер |
| 40 | 12, 32-33 | 17 | Тонка і товста кишка (36950) | Петлі розширені | 487918,2 | 7,16 | Нормоводдя | Кишкова непрохідність, СЗРП-I | Цитолог. дослідження навколо-плідних вод, 12 т (норма) | 2400 (36 т) | Вижив |
| 41 | 14, 30, 34 | 19 | Тонка і товста кишка (53768) | Без змін | 489856 | 1,07 | Нормоводдя | - | Біоптат плаценти, 14 т (норма) | 3200 г (37-38т) | Вижив |
| 42 | 35, 36 | 38 | Тонка і товста кишка (286130) | Без змін | 306159,1 | 1,7 | Маловоддя | - | Кордоцентез, 35 т (норма) | 3000 г (36-37т) | Вижив |
| 43 | 21, 23, 34 | 26,5 | Тонка і товста кишка (360096) | Без змін | 328050 | 0,9 | Нормоводдя | • Сколіоз • СЗРП I | Біопсія плаценти, 21 т (норма) | 2700 г (37т) | Вижив |

трикратне — у 40,6% (n=13), чотирикратне — у 12,5% (n=4), а однократне — лише в 17,9% (n=7). Це пов'язано з пізнім направленням вагітності з ГШ у плода на пренатальну діагностику в ІПАГ із терміном гестації 34–38 тижнів, у середньому — 35,4±0,6 тижня.

При диспансерному пренатальному спостереженні плодів із ГШ термін між I і II обстеженнями становив 7,06±1,07 тижня, між II і III обстеженнями (при трикратному спостереженні) — 7,25±1,65 тижня, між III і IV спостереженнями (при чотирикратному огляді) — 3,0±1,08 тижня.

Розміри наскрізного параумбілікального дефекту ПЧС на момент останньої пренатальної УЗД варіювали в діаметрі від 9 до 38 мм, у середньому — 23,91±1,06 мм.

За межами черевної порожнини, попереду від ПЧС, над проекцією наскрізного дефекту ПЧС, в амніотичній рідині виявлено при УЗД конгломерат евентрованих органів (рис. 1).

Їх характер був сталим: тонка і товста кишка (100%, n=39). Крім цього, в 1 (2,6%) випадку візуалізувався шлунок. Об'єм евентрованих органів на момент остан-

ньої пренатальної УЗД був від 27905,4 мм³ до 918720 мм³, у середньому — 256315,7±36114,6 мм³.

При визначенні стану евентрованих органів констатовано, що в меншості (23,1%), n=9 плодів вони були не зміненими. У більшості (76,9%, n=30) випадків діагностовано їх патологічні зміни у вигляді ущільнення і потовщення стінки кишки (66,7%, n=20), розширення просвіту (53,3%, n=16), у тому числі з рівнем рідини (6,7%, n=2). У 6 (20%) випадках виявлено поєднання ущільнення і потовщення стінки кишки з розширенням її просвіту. В 1 (3,3%) плода діагностовано нашарування фібрину на стінках евентрованого кишечника з ділянками їх некрозу.

З метою визначення індексу ВАД,крім вимірювання об'єму евентрованих органів, визначено об'єм черевної порожнини (n=21), який варіював від 41540,0 мм³ до 695520,0 мм³, у середньому — 481403,4±168422,54 мм³.

Індекс ВАД, визначений у 23 плодів із ГШ, становив від 0,4 до 7,16, у середньому — 1,8±0,3. Нами (Слепов О. К., Гордієнко І. Ю.) розроблено класифікацію ВАД за даними пренатальної УЗД. Згідно з нею, ВАД вважали помірною



Рис. 1. Пренатальні ультрасонограми плода при гастрошизисі в термії гестації 34 тижні



Рис. 2 Вигляд новонароджених дітей з гастрошизисом.

при індексі 0,9–0,5; вираженою — при індексі <0,5; відсутньою — при індексі ≥1. Згідно з цією класифікацією ВАД була помірною у 6 (26,1%) плодів, вираженою — у 3 (13,0%), відсутньою — у 14 (60,9%).

При оцінці кількості навколоплідних вод встановлено, що в більшості випадків (53,8%, n=21) виявлено порушення їх кількості: здебільшого маловоддя — 38,5% (n=15), значно менше багатоводдя — 15,3% (n=6). Менше ніж у половини (46,2%, n=18) випадків визначено фізіологічну кількість навколоплідних вод. Також нами проаналізовано, чи впливає порушення кількості навколоплідних вод на прогноз ГШ. З цією метою порівняно кількість фатальних наслідків при нормальній кількості навколоплідних вод та при їх порушенні (зменшенні або збільшенні). Виявлено, що при нормоводді незадовільних наслідків у плодів із ГШ було 3 (16,7%), а при патології кількості навколоплідних вод — 5 (23,8%), при $P>0,05$ ($p=0,8$). Таким чином, за нашими даними, кількість навколоплідних вод не впливає на прогноз при ГШ.

Асоційовані вади розвитку при пренатальному УЗД виявлено у 41,0% (n=16) плодів з ГШ, із них множинні — у 10,2% (n=4). Переважали інtestинальні аномалії — кишкова непрохідність — 25,6% (n=10). Рідше виявлено вади нирок — 12,8% (n=5): піелоектазію (2), подвоєння (2), дистопію (1); вади опорно-рухового апарату — 10,2% (n=4) (сколіоз (3), косолапість (1)) та серця — 2,5% (n=1).

Супутні патології (набуту) пренатально діагностовувано у 43,6% (n=17) випадків. Найбільш часто — затримку внутрішньоутробного розвитку плода (ЗВУРП) — 35,9% (n=14); рідше — фетоплацентарну недостатність (ФПН) — 10,2% (n=4) і УЗД маркери внутрішньоутробного інфікування — 5,1% (n=2).

Інвазивне дослідження каротипу плода з наявністю ГШ проведено в більшості випадків — 61,5% (n=24). З цією метою виконано трансабдомінальний кордоцентез (n=13),

біопсію плаценти (n=9), хоріона (n=1) або цитологічне дослідження навколоплідних вод (n=1). У жодному випадку не виявлено хромосомні патології, каротип відповідав нормі.

У частини (38,5%, n=15) vagітних інвазивне дослідження каротипу плода не проведено. Причинами цього були: пізнє звертання vagітної для обстеження — 17,9% (n=7), відмова vagітної жінки від інвазивного обстеження — 20,5% (n=8).

Після пренатального обстеження і диспансеризації усі vagітні жінки з ГШ у плода були госпіталізовані в акушерські клініки ІПАГ у терміні гестації 35–36 тижнів. Пологи планувалися у терміні 36–37 тижнів виключно шляхом кесаревого розтину з метою профілактики травматичного шоку новонародженого, патологічних змін евентрованого кишечнику та його травмування при природному родорозрішенні. Родорозрішення у 93,0% (n=40) жінок проводилося шляхом кесаревого розтину. В акушерській операційній (пологовій залі) обов'язково були присутні, крім неонатолога, дитячі хірурги та реаніматологи. Клінічний діагноз «ГШ» після народження дитини не викликав сумніву (рис. 2).

У 100% (n=43) випадках відмічався типовий для цієї вади розвитку наскрізний дефект ПЧС. Отвір локалізувався параумбілікально, справа від розщепленого пупкового кільця, при нормальному сформованій пуповині. Дефект ПЧС сягав від 2 до 5 см у діаметрі, у середньому — $3,15 \pm 0,1$ см. На ПЧС візуалізувалися такі за частотою евентровані органи черевної порожнини: тонкі і товста кишка — 100% (n=43), шлунок — 65,1% (n=28), дванадцятипала кишка — 23,2% (n=10), підшлункова залоза — 23,2% (n=10), матка з придатками (n=2) або її придатки (n=7) у дівчаток та яєчко (n=2) у хлопчиків — 25,6% (n=11), печінка (n=1) або жовчний міхур (n=2) — 6,9% (n=3), сечовий міхур — 2,3% (n=1).

У перші секунди життя новонародженим із ГШ проводилися: постановка назогастрального зонду, інтубація трахеї з ШВЛ мішком Амбу, катетеризація вазофіксом двох периферичних вен системи верхньої порожнини вени, з довінним введенням атропіну, конакіону та морфіну (з метою знеболення). Новонароджений в умовах транспортного кювезу, із ШВЛ і моніторингом вітальних функцій, терміново доставлявся в заздалегідь підготовлену операційну з бригадою хірургів дитячої хірургічної клініки. Там у перші хвилини життя новонародженого (від 10 до 25 хвилин) йому проводилася оперативна корекція ГШ — «Хірургія перших хвилин».

У результаті пренатальних УЗД та інтраопераційної ревізії у 41,8% (n=18) випадках серед новонароджених із ГШ виявлено супутні вади розвитку, причому множинні — у 18,6% (n=8), ізольовані — у 23,2% (n=10). Серед них були: атрезія кишки — 13,9% ((n=6) (голодної (n=2), здухвинної (n=3), ободової (n=1)), криптоторхізм — 11,6% (n=5), наскрізний дефект брижі — 11,6% (n=5), дивертикул Меккеля — 9,3% (n=4), гемангіома стінки кишки — 6,9% (n=3), сколіоз — 6,9% (n=3), гідронефроз (n=1) або подвоєння нирки (n=1) — 4,6%, артгропоз — 2,3% (n=1). Крім цього, діагностовано ускладнення ГШ у вигляді некрозу стінки кишки — 9,3% (n=4) або її перфорації — 4,6% (n=2).

Після операції дитина переводилася до відділення реанімації, де паралельно з інтенсивною терапією проводилося подальше постнатальне обстеження — 97,7% (n=42), з метою уточнення даних пренатального УЗД та діагностики можливих ускладнень у післяоператорному періоді.

На наступну добу після операції проводилися такі дослідження: ехокардіографія — 95,3% (n=41), неірсонографія — 95,3% (n=41), УЗД органів черевної порожнини

і заочеревинного простору — 97,7% (n=42), консультації спеціалістів — невролога — 95,3% (n=41), окуліста — 4,6% (n=2), педіатра — 62,8% (n=27) та інших (оториноларинголога, генетика, ортопеда) — 11,6% (n=5).

Ехокардіографія дала змогу діагностувати супутні природжені вади серця. Нейросонографія визначала можливі наслідки половогої черепно-мозкової травми та гіпоксії (внутрішньоплуночкові крововиливи, набряк головного мозку, наявність вад центральної нервої системи тощо). УЗД черевної порожнини визначало стан та локалізацію її органів після операції, наявність відновлення моторики ШКТ. УЗД заочеревинного простору дало змогу діагностувати (підтвердити) пренатальний діагноз вад розвитку нирок.

Консультативні висновки спеціалістів, зокрема невролога і окуліста, визначали ступінь ураження центральної нервої системи у новонароджених унаслідок гіпоксії головного мозку або його травмування під час пологів, можливість і характер лікування цієї патології.

У разі підоєзі на кишкову непрохідність (за даними пренатального УЗД або клінічних проявів у післяоперативному періоді) застосовувалося рентгенологічне дослідження у вигляді: оглядової рентгенографії органів грудної клітки і черевної порожнини — 41,9% (n=18), пасажу

контрасту (водорозчинного) по ШКТ — 16,3% (n=7), іригографії — 9,3% (n=4).

Висновки

У 100% оперованих новонароджених дітей з ГШ (n=43) діагноз установлено пренатально. Частота ранньої пренатальної діагностики ГШ (до 22 тижнів гестації) — 43,6%, що потребує подальшого удосконалення.

Основними критеріями пренатальної діагностики ГШ у плода є: локалізація і величина наскрізного дефекту ПЧС, характер евентрованих органів, їх стан та об'єм; об'єм черевної порожнини і ступінь ВАД; виявлення асоційованих вад розвитку та захворювань; кількість навколоплідних вод; цитогенетичне дослідження з визначенням каріотипу плода.

Алгоритм постнатальної діагностики ГШ та асоційованих вад розвитку і захворювань у новонароджених включає: УЗД органів черевної порожнини і заочеревинного простору; ехокардіографію і нейросонографію; оглядову рентгенографію органів грудної клітки і черевної порожнини, пасаж контрасту по ШКТ, іригографію — при підоєзі на кишкову непрохідність; консультацію невролога, а за необхідності — й інших спеціалістів.

ЛІТЕРАТУРА

- Бисалиев Б.Н. Оптимизация лечения гастрошизиса: дис. ... к.мед.н. / Б.Н. Бисалиев. — Москва, 2011. — 120 с.
- Плохих Д.А. Хирургическое лечение гастрошизиса с висцеро-абдоминальной диспропорцией: дис. ... к.мед.н. / Д.А. Плохих. — Кемерово, 2007. — 22 с.
- Порівняльна характеристика анатомічних особливостей та стану евентрованих органів при гастрошизисі у дітей народжених природним шляхом та за допомогою кесаревого розтину / О.К. Слепов, Н.І. Грасюкова, В.П. Сорока [та ін.] // Перинатологія и педіатрія. — 2014. — № 3 (59). — С. 16—20.
- Пренатальна діагностика та ведення вагітності при вроджених вадах розвитку передньої черевної стінки у плода / О.М. Тарапурова, І.Ю. Гордієнко, Т.В. Нікітіна [та ін.] // Ультразвукова перинатальна діагностика. — 2006. — № 2. — С. 59—71.
- Слепов О.К. Частота і причини смертності новонароджених дітей із гастрошизисом / О.К. Слепов, В.Л. Весельський, Н.І. Грасюкова // Хірургія дитячого віку. — 2014. — № 3 (4). — С. 81—87.
- Abdominal wall defects and congenital heart disease / C. Gibbin, S. Tonch, R.E. Broth [et al.] // Ultrasound Obstet. Gynecol. — 2003. — Vol. 21 — P. 334—337.
- Bianchi A. Elective delayed reduction and no anesthesia: minimal intervention management for gastoschisis / A. Bianchi, A. Dickson // J. Pediatr. Surg. — 1998. — Vol. 53, № 9. — P. 1338—1340.
- Cedergren M. Detection of fetal structural abnormalities by an 11—14 week ultrasound dating scan in an unselected Swedish population / M. Cedergren, A. Selbing // Acta Obstet. Gynecol. Scand. — 2006. — Vol. 85. — P. 912—915.
- Chabra S. Management of gastoschisis: prenatal, perinatal and neonatal / S. Chabra // Neoreviews. — 2006. — Vol. 7. — P. 419—427.
- David A.L. Gastoschisis: conographic diagnosis, associations, management and outcome / A.L. David, A. Tan, J. Curry // Prenatal. Diagn. — 2008. — Vol. 29. — P. 633—644.
- Gastroschisis and exomphalos in Ireland 1998 — 2004. Does antenatal diagnosis impact on outcome? / F.L. Murphy, J.A. Mazlan, F. Jarheen [et al.] // Pediatr. Surg. Int. — 2007. — Vol. 23. — P. 1059—1063.
- Feldkamp M.L. Development of gastoschisis: review of hypotheses, novel hypothesis, and implications for research / M.L. Feldkamp, J.C. Carey, T.W. Sadler // Am. J. Med. Genet. — 2007. — Vol. 143A. — P. 639—652.
- Holland A.J.A. Gastoschisis an update / A.J.A. Holland, K. Walker, N. Badanti // Pediatr. Surg. Int. — 2010. — Vol. 26. — P. 871—878.
- Increasing risk of gastroschisis in Norway: an age-period-cohort analysis / M. Kazanra, R. Sic, S. Irgens [et al.] // Am. J. Epidemiol. — 2004. — Vol. 159. № 4. — P. 358—363.
- Islam S. Clinical care outcomes in abdominal wall defects / S. Islam // Curr. Opin. Pediatr. — 2008. — Vol. 20. — P. 305—310.
- Is there a therapeutic role for fetoscopic surgery in the prenatal treatment of gastroschisis? A feasibility study in sheep / T. Kohl, K. Tchatcheva, R. Stressig [et al.] // Surg. Endosc. — 2009. — Vol. 23. — P. 1499—1505.
- Joane M. Increasing prevalence of gastroschisis in Europe 1980 — 2002: a phenomenon restricted to younger mothers? / M. Joane, H. Dolk, I. Bradbury // Paediatr. Perinat. Epidemiol. — 2007. — Vol. 21. — P. 363—369.
- Joo J. G. Abdominal wall malformations in a 15 — year fetopatological study: accuracy of prenatal ultrasonography diagnosis / J.G. Joo, E. Castellos, J.Jz. Rigo // Prenat. Diagn. — 2010. — Vol. 30. — P. 1015—1018.
- Kronfli R. Intestinal atresia in association with gastroschisis: a 26 — year review / R. Kronfli, T.J. Bradnock, A. Sabharwal // Pediatr. Surg. Int. — 2010. — Vol. 26. — P. 891—894.
- Nicholas S. Estimation of fetal weight in fetuses with abdominal wall defects comparison of 2 recent sonographic formulas to formula / S. Nicholas, M.G. Tunli, J. Dicke [et al.] // J. Ultrasound. Med. — 2010. — Vol. 29. — P. 1069—1074.
- Outcomes in neonates with gastroschisis in U. S. children's hospitals / Lao O. B., Larison C., Garrison M. M. [et al.] // Am. J. Perinatal. — 2010. — Vol. 27. — P. 97—101.
- Prenatal risk factors and outcomes in gastroschisis: a meta-analysis / D'Antonio, Virgone C., Rizzo G. [et al.] // Pediatrics. — 2015. — Vol. 136. — P. 159—169.
- Reid K. The epidemiologic incidents of congenital gastoschisis in Western Australia / K. Reid, J. Dickinson, D. Donerty // Am. J. Obstet. Gynecol. — 2003. — Vol. 189. № 3. — P. 764—768.
- Risk stratification in gastoschisis: can prenatal evaluation or early postnatal factors predict outcome? / R.P. Davis, M.C. Treadwell, R.A. Drongowski [et al.] // Pediatr. Surg. Int. — 2009. — Vol. 25. — P. 319—325.
- The outcome of gastoschisis after a prenatal diagnosis or a diagnosis only at birth. Recommendations for prenatal surveillance / T.E. Cohen—Overbeck, T.R. Hartmann, E.A. Stugers [et al.] // Eur. J. Obstet. Gynecol. Reprod. Biol. — 2008. — Vol. 139. — P. 21—27.

-
26. Towers C.V., Carr M.N. Antenatal fetal surveillance in pregnancies complicated by fetal gastroschisis / C.V. Towers, M.N. Carr // Am. J. Obstet. Gynecol. — 2008. — Vol. 198. — P. 686—695.
27. Sadler T.W. The embryologic origin of ventral body wall defects / T.W. Sadler // Semin. Pediatr. Surg. — 2010. — Vol. 19. — P. 209—214.
28. Sekabira J. Gastroschisis: a third world perspective / J. Sekabira, G.P. Hadley // Pediatr. Surg. Int. — 2009. — Vol 25. — P. 327—329.
29. Wilson R.D. Congenital abdominal wall defects: an update / R.D. Wilson, M.P. Johnson // Fetal Diagnos. Ther. — 2004. — Vol. 19. — P. 385—398.
-

Перинатальная диагностика гастрошизиса у плодов и новорожденных детей

А.К. Слепов¹, И.Ю. Гордиенко¹, В.Л. Весельский², Е.Н. Тарапурова¹, А.А. Гребиниченко¹, В.П. Сорока¹, А.П. Пономаренко¹, А.В. Величко¹

¹ГУ «Институт педиатрии, акушерства и гинекологии НАМН Украины», г. Киев

²Национальная академия медицинских наук Украины, г. Киев, Украина

Цель — разработать и усовершенствовать характер и объем пренатальной и ранней постнатальной диагностики гастрошизиса у плодов и новорожденных детей.

Пациенты и методы. В ГУ «Институт педиатрии, акушерства и гинекологии НАМН Украины» за 2006—2015 гг. пренатально обследованы 43 плода с гастрошизисом. Во время пренатального обследования плода с гастрошизисом, кроме специалистов УЗИ, обязательно присутствовал детский хирург.

Результаты. У 100% прооперированных новорожденных детей с гастрошизисом диагноз установлен пренатально. Частота ранней пренатальной диагностики гастрошизиса (до 22 недель гестации) — 43,6%, что требует дальнейшего усовершенствования.

Выводы. Основными критериями пренатальной диагностики гастрошизиса у плода являются: локализация и величина сквозного дефекта передней брюшной стенки, характер эвентрированных органов, их состояние и объем; объем брюшной полости и степень висцероабдоминальной диспропорции; выявление ассоциируемых пороков развития и заболеваний; количество околоплодных вод; цитогенетическое исследование с определением кариотипа плода. Алгоритм постнатальной диагностики гастрошизиса и ассоциируемых пороков развития и заболеваний у новорожденных включает: УЗИ органов брюшной полости и внебрюшного пространства; эхокардиографию и нейросонографию; обзорную рентгенографию органов грудной клетки и брюшной полости, пассаж контраста по желудочно-кишечному тракту, ирригографию — при подозрении на кишечную непроходимость; консультацию невролога, а при необходимости — и других специалистов.

Ключевые слова: новорожденные дети, гастрошизис, пренатальная диагностика, постнатальная диагностика.

Prenatal diagnosis of gastroschisis in fetuses and newborns

O.K. Slyepov¹, I.Yu. Gordienko¹, V.L. Veselskiy², O.M. Tarapurova¹, G.O. Hrebinichenko¹, V.P. Soroka¹, O.P. Ponomarenko¹, A.V. Velychko¹

¹SI «Institute of Pediatrics, Obstetrics and Gynecology NAMS of Ukraine», Kiev

²National Academy of Medical Sciences of Ukraine, Kiev, Ukraine

Objective — to develop and improve the nature and extent of prenatal and early postnatal diagnosis of gastroschisis in fetuses and newborns.

Patients and methods. For the period 2006–2015 yy. in SI «Institute of Pediatrics, Obstetrics and Gynecology NAMS Ukraine» prenatally have been examined 43 fetuses with gastroschisis. During the prenatal fetal examinations with gastroschisis in addition to the ultrasound specialists obligatory was present pediatric surgeon.

Results. At 100% operated newborns with gastroschisis diagnosis was established prenatally. The frequency of early prenatal diagnosis of gastroschisis (up to 22 weeks gestation) — 43.6%, which requires further improvements.

Conclusions. The main criteria for prenatal diagnosis of gastroschisis in the fetus are: the localization and size of the through defect of anterior abdominal wall, character of eventrated organs, their condition and amount; the volume of the abdominal cavity and the degree visceroabdominal imbalances; definition of associated malformations and diseases; the amount of amniotic fluid; cytogenetic examination with the definition of fetal karyotype. The algorithm of postnatal diagnosis of gastroschisis and associated malformations of diseases in newborn includes: ultrasound investigation of the abdomen and extra-abdominal areas; echocardiography and cranial ultrasonography; plain radiography of the chest and abdomen, contrast passage through the gastrointestinal tract, ergography — for suspected intestinal obstruction; neurologist consultation, and if necessary — consultation of other professionals.

Key words: newborns, gastroschisis, prenatal diagnosis, postnatal diagnosis.

Сведения об авторах:

Слепов Алексей Константинович — засл. врач Украины, д.мед.н., проф., руководитель отделения хирургической коррекции врожденных пороков развития детей ГУ «Институт педиатрии, акушерства и гинекологии НАМН Украины». Адрес: г. Киев, ул. П. Майбороды, 8; тел. (044) 483-62-28.

Гордиенко Ирина Юрьевна — д.мед.н., проф., руководитель отделения медицины плода ГУ «Институт педиатрии, акушерства и гинекологии НАМН Украины».

Адрес: г. Киев, ул. П. Майбороды, 8.

Пономаренко Алексей Петрович — к.мед.н., н.с. отделения хирургической коррекции врожденных пороков развития детей ГУ «Институт педиатрии, акушерства и гинекологии НАМН Украины». Адрес: г. Киев, ул. П. Майбороды, 8; тел. (044) 483-62-28.

Мигур Михаил Юрьевич — врач-хирург детский, мл.н.с. отделения хирургической коррекции врожденных пороков развития детей ГУ «Институт педиатрии, акушерства и гинекологии НАМН Украины». Адрес: г. Киев, ул. П. Майбороды, 8; тел. (044) 483-62-28.

Коцковский Владимир Васильевич — врач-хирург детский отделения хирургической коррекции врожденных пороков развития детей ГУ «Институт педиатрии, акушерства и гинекологии НАМН Украины». Адрес: г. Киев, ул. П. Майбороды, 8; тел. (044) 483-62-28.

Пономаренко Максим Викторович — врач-уролог детский отделения хирургической коррекции врожденных пороков развития детей ГУ «Институт педиатрии, акушерства и гинекологии НАМН Украины». Адрес: г. Киев, ул. П. Майбороды, 8; тел. (044) 483-62-28.

Статья поступила в редакцию 23.02.2016 г.